


EQ FLTR


POD
ΔΕΞΑΜΕΝΗ

INNOKIN



EL

Πίστετε προς τα κάτω και περιστρέψτε για να απελευθερώσετε/ κλειδώσετε την δεξαμενή



Τρόπος γεμίσματος

1. Τραβήξτε την γλωττίδα για να ανοίξετε.
2. Προσθέστε το υγρό προσεκτικά.
3. Τραβήξτε τη λαβή για να κλείσει.



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

Περιμένετε 5 λεπτά μετά την πλήρωση για να απορροφήσει η αντίσταση το υγρό

EL



Τρόπος αλλαγής αντίστασης

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΔΕΙΤΕ ΠΩΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ.

1. Γυρίστε τη βάση, για να ανοίξει.
2. Τραβήξτε, για να αφαιρέσετε την αντίσταση.
3. Τοποθετήστε νέα αντίσταση.
4. Γυρίστε τη βάση, για να κλείσει ασφαλώς.

EL

Οδηγίες χρήσης και επαναπλήρωση:

Ασφαλής χρήση:

Δεν προορίζεται για κατάποση. Αποφύγετε οποιαδήποτε επαφή του υγρού με το δέρμα. Να διατηρείτε τη συσκευή σας σύμφωνα με τις ορθές πρακτικές υγιεινής. Ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια αν αισθανθείτε ναυτία ή εμετό, κατά τη χρήση της συσκευής του ηλεκτρονικού τσιγάρου. Τα υγρά αναπλήρωσης του ηλεκτρονικού τσιγάρου δεν πρέπει να αναμινώνονται με οποιαδήποτε άλλα υγρά ή ουσίες. Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή του ηλεκτρονικού τσιγάρου όταν οδηγείτε. Για να αποφευχθεί πιθανή χρήση υπερβολικής δόσης νικοτίνης, το ηλεκτρονικό τσιγάρο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ταυτόχρονα με άλλες πηγές της νικοτίνης (παροδοσιακά τσιγάρα, πούρα, πίπες, έμπλαστρα, ρινικά σπρέι κλπ). Να μην ελευθερώνεται στο περιβάλλον και να μην απορρίπτεται στην αποχέτευση.

Αποθήκευση:

- Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά και ανηλικούς σε ασφαλισμένο χώρο αποθήκευσης.
- Το προϊόν πρέπει να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
- Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε το προϊόν σε μερμή με υπερβολική υγρασία ή/και πολύ υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες. Εάν σκοπεύετε να μη χρησιμοποιήσετε τον ατμοποιητή για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε τον

από τη συσκευή, αδειάστε τον από το υγρό αναπλήρωσης και αφαιρέστε την αντίσταση.

Κίνδυνος εθισμού και τοξικότητας

Η ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ.

Αν το προϊόν χρησιμοποιείται με υγρό αναπλήρωσης που περιέχει νικοτίνη

Το προϊόν περιέχει νικοτίνη, που είναι εξαιρετικά εθιστική και τοξική ουσία. Η χρήση του προϊόντος δεν συνιστάται σε μη καπνιστές και νέους.

Προειδοποιήσεις για Ομάδες κινδύνου:

Αν το προϊόν χρησιμοποιείται με υγρό αναπλήρωσης που περιέχει νικοτίνη

Μην εισπνέετε το προϊόν αν είστε αλλεργικοί στη νικοτίνη ή σε οποιοδήποτε από τα συστατικά του. Εάν έχετε οποιοδήποτε είδους προβλήματα υγείας ή οποιαδήποτε μορφή ερεθισμού κατά τη χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου, συμβουλευτείτε γιατρό. Η χρήση της συσκευής δεν συνιστάται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή του θηλασμού. Η χρήση του ηλεκτρονικού τσιγάρου από νεαρή ηλικία μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα υγείας. Η νικοτίνη είναι μια πολύ επικίνδυνη και μερικές φορές θανατηφόρα ουσία, αν χρησιμοποιηθεί ή κατασπεί από μικρά παιδιά. Συμβουλευτείτε γιατρό πριν τη χρήση κατά τη διάρκεια εγκυμοσύνης.

Αντενδείξεις:

Αν το προϊόν χρησιμοποιείται με υγρό αναπλήρωσης που περιέχει νικοτίνη

Υπερτασθηνία στη νικοτίνη ή στα περιεχόμενα συστατικά, κύηση, γαλουχία, καρδιοαναπνευστική ανεπάρκεια. Η νικοτίνη θα πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή από άτομα που έχουν διαγνωσθεί με: μέτρια έως σοβαρή ηπατική νόσο, σοβαρή νεφρική νόσο, καρδιακή νόσο συμπεριλαμβανομένης της στεθάγχης, της καρδιακής ανεπάρκειας, πολύ υψηλή πίεση αίματος, προβλήματα με τον καρδιακό ρυθμό ή παλμό, οι ασθενείς που έχουν υποστεί μια πρόσφατη καρδιακή προσβολή ή εγκεφαλικό επεισόδιο, υπερθυρεοειδισμό, διαβήτη, φλεγμονή του οισοφάγου (σωλήνα μεταξύ του στόματος και του στομάχου), φλεγμονή της βλεννογόνου του στομάχου (γαστρίτιδα), έλκος στομάχου, έλκος δωδεκαδακτύλου, δερματικά προβλήματα, μακροπρόθεσμα προβλήματα στο λαιμό, δυσκολία στην αναπνοή λόγω βρογχίτιδας, εμφύσημα ή άσθμα, εγκυμοσύνη και θηλασμός.

Ανεπιθύμητα συμπτώματα:

Αν το προϊόν χρησιμοποιείται με υγρό αναπλήρωσης που περιέχει νικοτίνη
Συστηματικά συμπτώματα που μπορεί να παρατηρηθούν κατά τη χρήση νικοτινικών υγρών αναπλήρωσης: ναυτία και έμετος, διαταραχές ύπνου, πονοκέφαλος, πόνος στο στήθος εξαιτίας της

τοξικότητας της νικοτίνης. Ζητήματα ήπιας έως μέτριας τοξικότητας: διαταραχή γαστρεντερικού συστήματος, ναυτία, έμετος, ζάλη, πονοκέφαλος, τρόμος, εφίδρωση, ακανόνιστος καρδιακός παλμός ή ταχυκαρδία, ωχρότητα και υπέρταση είναι κοινά συμπτώματα. Ζητήματα σοβαρής τοξικότητας: Σπασμοί, ζάλη, αδυναμία, βραδυκαρδία, υπόταση και αναπνευστική ή μυϊκή παράλυση μπορεί να συμβούν. Τα συμπτώματα μπορεί να εμφανιστούν τυπικά από 30 λεπτά έως 2 ώρες μετά από στοματική επαφή. Τα συμπτώματα μπορεί να εμφανιστούν αμέσως μετά την εισπνοή της νικοτίνης.

Αν έχετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω συμπτώματα ή αν ένα παιδί κάτω των 12 ετών καταπιεί προϊόν που περιέχει νικοτίνη, επικοινωνήστε ΑΜΕΣΩΣ με το γιατρό σας ή με το τμήμα επείγοντων περιστατικών του τοπικού νοσοκομείου σας.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: +30 2107793777
Στοιχεία επικοινωνίας: παρακαλώ συμβουλευτείτε την εξωτερική συσκευασία με τα στοιχεία του υπευθύνου διάθεσης.

