


VAPORESSO

FORZ TX80 Tank

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν Vaporesso. Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες πριν τη χρήση, για να εξασφαλίσετε μία τέλεια εμπειρία.

Εάν υπάρχει κάποια επιπρόσθετη ανάγκη σχετικά με αυτό το προϊόν, παρακαλούμε συμβουλευθείτε τον τοπικό έμπορο ή επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της ιστοσελίδας μας: www.vaporesso.com

ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΙΚΟΝΑ



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Τοποθετείστε την δεξαμενή

Τοποθετείστε την δεξαμενή στην μπαταρία βιδώνοντας το σπειρώμα 510. Βεβαιωθείτε ότι είναι γερά στερεωμένες.

2. Αντικαταστήστε την Coil (Ελέγξτε το Σχήμα 1 στη σελίδα 2)

- Ξεβιδώστε τη βάση του σπειρώματος από την δεξαμενή
- Τραβήξτε την χρησιμοποιημένη coil μέσα στην δεξαμενή
- Τοποθετείστε μία νέα coil στην δεξαμενή
- Επανατοποθετείστε τη βάση του σπειρώματος.

3. Γέμιση υγρού αναπλήρωσης (Ελέγξτε το Σχήμα 2 στη σελίδα 2)

- Ξεβιδώστε το καπάκι της κορυφής από την δεξαμενή
- Πληρώστε με το υγρό αναπλήρωσης μέσω των δύο θυρών αναπλήρωσης
- Επανατοποθετείστε το άνω καπάκι στην θέση του
- Περιμένετε 5 λεπτά μέχρι το υγρό αναπλήρωσης να καλύψει την coil πλήρως.

4. Προσαρμογή της ροής αέρα

Για να ρυθμίσετε την ροή αέρα, περιστρέψτε τον δακτύλιο εισόδου αέρα στο κάτω μέρος της δεξαμενής.

ΠΡΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Αυτό το επαναπληρώσιμο ηλεκτρονικό τσιγάρο προορίζεται για χρήση με το συμβατό υγρό αναπλήρωσης, το οποίο ενδέχεται να περιέχει νικοτίνη. Η νικοτίνη είναι μία εθιστική ουσία και δεν είναι κατάλληλη ή συνιστώμενη στις παρακάτω περιπτώσεις

1. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για:

- Άτομα τα οποία είναι κάτω από την επιτρεπόμενη ηλικία καπνίσματος.
- Άτομα τα οποία πάσχουν από ασθένειες της καρδιάς, του στομάχου ή έλκη του δωδεκαδάκτυλου, σε άτομα με προβλήματα στο ήπαρ ή το νεφρό, χρόνιες ασθένειες του φάρυγγα ή δυσκολία αναπνοής λόγω βρογχίτιδας, εμφυσήματος ή άσθματος.
- Άτομα με υπερενεργό τον θυρεοειδή αδένα ή που πάσχουν απόφαιοχρωμοκττωμα (έναν όγκο του επινεφριδιακού αδένα που μπορεί να επηρεάσει την πίεση του αίματος).
- Άτομα τα οποία λαμβάνουν κάποια φαρμακευτική αγωγή, όπως Θεοφυλλίνη, Ροπιρινόλη ή Κλοζαπίνη και άλλα..

2. Η συσκευή αυτή δεν ενδείκνυται για:

- Μη καπνίζοντες
- Εγκύους ή γυναίκες που θηλάζουν

3. Αν χρησιμοποιήσετε ένα υγρό αναπλήρωσης με νικοτίνη με αυτό το προϊόν, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε τα παρακάτω αποτελέσματα: Αν συμβεί αυτό, συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία υγείας και δείξτε τους αυτό το φυλλάδιο αν μπορείτε:

- Νιώθετε κομμάρα - Ναυτία
- Ζαλάδα - Πονοκέφαλο - Βήχα
- Ερεθισμό της στοματικής ή φαρυγγικής κοιλότητας
- Δυσφορία του στομάχου - Λόξιγκα
- Ρινική συμφόρηση - Εξέμεση
- Ταχυπαλμία/πόνους ή ασυνήθιστο καρδιακό παλμό

Η συσκευή αυτή δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για άτομα κάτω από την ηλικία καπνίσματος.